

**PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS DA REAPLICAÇÃO DA  
PROVA DE HABILIDADES CLÍNICAS – REVALIDA 2022/1**

**ATENÇÃO**

As páginas a seguir apresentam o Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) da Prova de Habilidades Clínicas da Edição 2022/2 (Aplicação Regular), que também serviu como Reaplicação da Edição 2022/1, conforme previsto no 16.9 do edital nº 35, de 04 de maio de 2022:

“16.9 Eventuais problemas de aplicação que inviabilizem a realização da prova de habilidades clínicas ou a avaliação do desempenho do participante na 2ª etapa do Revalida 2022/1 serão tratados de maneira específica, podendo ser adotado o procedimento de inclusão do participante afetado na aplicação da 2ª Etapa da edição subsequente do Revalida, para a realização parcial ou total das estações, conforme o caso.”

---

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se e cumprimenta o paciente simulado; (2) pergunta algum dado de identificação (idade, estado civil, profissão e/ou nacionalidade).</p> <p><b>Adequado:</b> realiza todos os procedimentos. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza um dos procedimentos. <b>Inadequado:</b> não realiza procedimento algum.</p>	0	0,125	0,25
<b>ANAMNESE</b>			
<p><b>2. Pergunta sobre manifestações durante e após a crise:</b> (1) movimentos involuntários (ou convulsão); (2) liberação esfinteriana; (3) lesões na língua; (4) lesões no crânio e na face (ou bateu com a cabeça); (5) padrão de recuperação.</p> <p><b>Adequado:</b> investiga três ou mais achados clínicos. <b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois achados clínicos. <b>Inadequado:</b> investiga apenas um achado clínico ou não investiga achado clínico algum.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>3. Pergunta sobre manifestações que precedem a crise:</b> 1) uso de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas; 2) alimentação e jejum; 3) atividade física; 4) eventos similares anteriores; 5) doenças prévias e traumas. <b>Adequado:</b> investiga três ou mais achados. <b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois achados. <b>Inadequado:</b> investiga apenas um achado ou não investiga achado algum.</p>	0	0,75	1,5
<b>EXAME FÍSICO</b>			
<p><b>4. Solicita exame físico (1) geral e (2) neurológico.</b> <b>Adequado:</b> solicita exame físico especificando aspecto neurológico. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita exame físico mas não especifica aspecto neurológico. <b>Inadequado:</b> não solicita exame físico.</p> <p><b>Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso solicite o exame físico ANTES de receber o impresso.</b></p>	0	0,5	1,0

<p><b>5. Solicita exames laboratoriais:</b> (1) glicemia; (2) sódio; (3) potássio; (4) hematócrito/hemoglobina ou hemograma; (5) cálcio e (6) magnésio.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita de quatro a seis dos exames listados.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita de dois a três dos exames listados.</p> <p><b>Inadequado:</b> solicita um dos exames listados ou não solicita exame algum.</p> <p><b>Atenção: O candidato só irá pontuar caso ele cite os exames listados ANTES de receber o impresso. Só serão considerados os seis primeiros exames citados pelo participante ANTES de receber o impresso.</b></p>	0	0,75	1,5
<p><b>6. Solicita e interpreta o eletrocardiograma (ECG).</b></p> <p><b>Adequado:</b> solicita e relaciona os achados do ECG (PR-Curto ou Wolf-Parkinson-White <b>ou presença de onda delta</b>) a riscos de arritmia (<b>ou alteração da atividade elétrica do coração</b>).</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita, mas não interpreta corretamente o achado.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0	0,75	1,5
<p><b>7. Formula hipóteses diagnósticas.</b></p> <p><b>Adequado:</b> identifica e explica o diagnóstico de síncope ou desmaio/perda de consciência de origem cardíaca, relacionando-o à arritmia <b>ou alteração da atividade elétrica do coração</b> (mencionando ou não taquicardia ou pré-excitação ventricular ou Wolff- Parkinson-White).</p> <p><b>Inadequado:</b> não identifica a síncope ou desmaio/perda de consciência de origem cardíaca.</p>	0		1,5
<p><b>8. Seguimento do paciente:</b> encaminha para a cardiologia e/ou realização de <i>Holter</i>.</p> <p><b>Adequado:</b> encaminha.</p> <p><b>Inadequado:</b> não encaminha.</p>	0		1,5
<p><b>9. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao participante.</b></p> <p><b>Adequado:</b> realiza.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza.</p>	0		0,25

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>ANAMNESE E EXAME FÍSICO</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se e (2) cumprimenta o paciente simulado. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Inadequado:</b> realiza uma ou não realiza ação alguma.</p>	0		0,3
<p><b>2. Pergunta sobre características da dor:</b> (1) tempo de início, (2) localização, (3) progressão, (4) fatores de melhora ou piora. <b>Adequado:</b> pergunta sobre os quatro itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre dois ou três itens. <b>Inadequado:</b> pergunta sobre um ou nenhum item.</p>	0	0,3	0,6
<p><b>3. Pergunta sobre sintomas urinários:</b> (1) frequência, (2) urgência e/ou incontinência urinária, (3) hematúria, (4) noctúria, (5) jato fraco, (6) jato interrompido, (7) sensação de urina residual, (8) odor da urina, (9) Esforço/hesitação miccional inicial, (10) disúria, (11) Gotejamento terminal <b>Adequado:</b> pergunta pelo menos sobre seis itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre quatro ou cinco itens. <b>Inadequado:</b> pergunta sobre três itens ou menos.</p>	0	1,0	2,0
<p><b>4. Pergunta sobre:</b> (1) histórico pessoal e (2) histórico familiar de doenças. <b>Adequado:</b> pergunta sobre os dois itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre um dos itens. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0	0,2	0,4

<p><b>5. Solicita:</b> (1) exame físico; (2) toque retal.  <b>Adequado:</b> solicita os dois itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> solicita um item.  <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0	0,25	0,5
<b>INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA</b>			
<p><b>6. Solicita exames laboratoriais:</b>  (1) hemograma, (2) PCR, (3) PSA, (4) exame de urina (ou urina 1 ou sumário de urina ou parcial de urina), (5) urocultura.  <b>Adequado:</b> solicita os quatro itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> solicita, pelo menos, PSA e exame de urina.  <b>Inadequado:</b> não solicita exame de urina e/ou PSA.   <b>Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso cite os quatro exames corretamente antes de receber o impresso.</b></p>	0	0,3	0,6
<p><b>7. Interpreta os exames laboratoriais:</b> (1) HMG com leucocitose, (2) PCR aumentado, (3) hematopúria, (4) PSA aumentado. <b>Adequado:</b> interpreta os quatro itens. <b>Parcialmente adequado:</b> interpreta alteração nos itens (3) e (4). <b>Inadequado:</b> não interpreta os itens (3) e/ou (4).</p>	0	0,4	0,8
<p><b>8. Solicita exame de imagem:</b> ultrassom OU ultrassonografia OU ecografia de aparelho urinário E/OU de próstata.  <b>Adequado:</b> solicita.  <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5
<p><b>9. Formula a hipótese diagnóstica atual de prostatite aguda e/ou hiperplasia prostática benigna</b>  <b>Adequado:</b> formula a hipótese de prostatite aguda e/ou hiperplasia prostática benigna  <b>Parcialmente adequado:</b> formula somente a hipótese de hiperplasia prostática benigna  <b>Inadequado:</b> não formula.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>10. Correlaciona o aumento da próstata no USG com a prostatite e HPB.</b>  <b>Adequado:</b> correlaciona os dois diagnósticos.  <b>Parcialmente adequado:</b> correlaciona apenas um diagnóstico.  <b>Inadequado:</b> não correlaciona nenhum dos diagnósticos.</p>	0	0,4	0,8
<b>CONDUTA TERAPÊUTICA</b>			
<p><b>11. Indica tratamento: antibiótico ciprofloxacino ou levofloxacino</b>  <b>Adequado:</b> orienta o tratamento  <b>Inadequado:</b> não orienta o tratamento</p>	0		0,7
<b>RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE</b>			

<p><b>12. Explica o comportamento do PSA:</b>  (1) na hiperplasia benigna, o crescimento do PSA é proporcional ao tamanho da próstata;  (2) no câncer, o aumento é progressivo e lento;  (3) na prostatite, o aumento é rápido e abaixa após o tratamento.  <b>Adequado:</b> explica as três condições.  <b>Parcialmente adequado:</b> explica uma ou duas das condições acima.  <b>Inadequado:</b> não explica nenhuma das três condições.</p>	0	0,6	1,2
<p><b>13. Orienta o monitoramento do PSA após o tratamento inicial.</b>  <b>Adequado:</b> orienta.  <b>Inadequado:</b> não orienta.</p>	0		0,6
<p><b>14. Realiza a sequência das tarefas indicadas nas orientações ao(à) participante.</b>  <b>Adequado:</b> realiza.  <b>Inadequado:</b> não realiza.</p>	0		0,5

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>DADOS ANAMNÉSICOS</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se; (2) cumprimenta mãe de maneira adequada/cordial; (3) mantém contatovisual; (4) pergunta o nome da mãe e da criança. <b>Adequado:</b> realiza os quatro itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza dois ou três itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> realiza um ou nenhum item.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>2. Realiza anamnese:</b> (1) pergunta sinais e sintomas associados à queixa principal; (2) pergunta sobre os dados antenatais (gestação) ou dados perinatais (dados do RN) ou solicita a caderneta de saúde da criança/caderneta de vacinas/caderneta de imunização;</p> <p>(3) pergunta sobre antecedentes familiares; (4) pergunta sobre a situação epidemiológica.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza quatro itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza dois a três itens, sendo o <b>item (1) obrigatório</b>.</p> <p><b>Inadequado:</b> realiza apenas um ou nenhum item.</p>	0	1,5	3,0
<b>DADOS DO EXAME FÍSICO E DADOS DA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA</b>			
<p><b>3. Interpreta o exame físico: febre sem outras alterações.</b></p> <p><b>Adequado:</b> interpreta.</p> <p><b>Inadequado:</b> não interpreta ou interpreta com outros achados.</p>	0		0,5
<p><b>4. Solicita exames complementares:</b> (1) hemograma; (2) proteína C-Reativa ou procalcitonina; (3) hemocultura; (4) exame de urina (rotina de urina, urinatipo 1, parcial de urina, sumário de urina, EAS ou similares); (5) urocultura; (6) radiografia de tórax (Raio X de tórax); (7) coleta de líquido cefalorraquidiano (líquor/LCR); (8) <b>pesquisa de vírus respiratórios em nasofaringe (Sars-Cov-2; influenza;VSR).</b></p> <p><b>Adequado:</b> solicita <b>sete a oito</b> itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita quatro a seis itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> solicita três itens ou menos.</p>	0	1,25	2,5

**EXPLICAÇÃO DA PROPOSTA TERAPÊUTICA À MÃE / CONDUTA**

<p><b>5. Formula a hipótese diagnóstica de febre sem sinais localizatórios.</b>  <b>Adequado:</b> formula.  <b>Inadequado:</b> não formula ou formula outras hipóteses, como: febre, febre a ser esclarecida, febre de origem obscura, febre de origem indeterminada, sepse, sepse neonatal tardia, bacteremia oculta, infecção do trato urinário oculta, pneumonia oculta.</p>	0		1,0
<p><b>6. Indica necessidade de internação do recém-nascido.</b>  <b>Adequado:</b> indica.  <b>Inadequado:</b> não indica.</p>	0		1,0
<p><b>7. Indica a proposta terapêutica</b> (antibioticoterapia empírica, parenteral, endovenosa ou intramuscular, ampicilina + cefotaxima ou ampicilina + ceftriaxona).  <b>Adequado:</b> indica.  <b>Inadequado:</b> não indica ou indica antibioticoterapia via oral ou indica outro esquema de antibióticos.</p>	0		1,0
<p><b>8. Realiza adequadamente tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante.</b>   <b>Adequado:</b> realiza todas as tarefas propostas na ordem solicitada, podendo comunicar a decisão da internação a qualquer momento da consulta.   <b>Inadequado:</b> não realiza as tarefas propostas na ordem solicitada, independentemente do momento de comunicar a decisão da internação.</p>	0		0,5



## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
<b>ATENDIMENTO INICIAL E HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) pede à paciente que se sente. (2) tenta acalmar a paciente (com palavras ou gestos, como oferta de lenço de papel/copo de água). <b>Adequado:</b> realiza os dois procedimentos. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas um dos procedimentos. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum dos procedimentos.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>2. Pergunta se a paciente tem parcerias sexuais ou parceria fixa.</b> <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0		0,5
<p><b>3. Pergunta qual foi a data da última menstruação da paciente.</b> <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0		0,5
<p><b>4. Pergunta sobre a utilização de método anticoncepcional.</b> <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0		0,5
<p><b>5. Pergunta se a gravidez foi planejada e/ou desejada.</b> <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0		0,5
<p><b>6. Pergunta quando foi realizado o último exame preventivo (citologia OU colpocitologia OU papanicolau).</b> <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>	0		0,5
<b>PROPEDÊUTICA</b>			
<p><b>7. Indica a realização de teste sanguíneo de gravidez/ beta hCG.</b> <b>Adequado:</b> indica. <b>Inadequado:</b> não indica.</p>	0		1,5

<p><b>8. Informa à paciente que:</b> (1) a imagem no ultrassom só pode ser vista após determinado valor de beta hCG; (2) os batimentos cardíacos fetais só podem ser auscultados no ultrassom após cinco ou seis semanas de gestação.</p> <p><b>Adequado:</b> fornece as duas informações. <b>Parcialmente adequado:</b> fornece apenas uma informação.</p> <p><b>Inadequado:</b> não fornece nenhuma das duas informações indicadas.</p>	0	0,75	1,5
<p><b>9. Menciona:</b> (1) oferta de apoio psicológico e assistência social; (2) possibilidade de doação legal do bebê; (3) necessidade de apoio social específico (parceria e/ou familiares e/ou amigos).</p> <p><b>Adequado:</b> cita pelo menos um item.</p> <p><b>Inadequado:</b> não cita item algum.</p>	0		0,5
<p><b>10. Informa que o arcabouço normativo brasileiro não permite, nas circunstâncias da paciente, a realização de aborto.</b></p> <p><b>Adequado:</b> informa.</p> <p><b>Inadequado:</b> não informa.</p>	0		1,5
<p><b>11. Cita as situações em que o aborto é permitido no Brasil:</b> (1) estupro; (2) risco materno; (3) feto anencéfalo.</p> <p><b>Adequado:</b> cita integralmente as três situações.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> cita apenas duas situações.</p> <p><b>Inadequado:</b> cita uma situação ou não cita situação alguma.</p>	0	0,75	1,5
<b>ORIENTAÇÕES FINAIS</b>			
<p><b>12. Tranquiliza a paciente, explicando que ela terá a assistência necessária ao acompanhamento de sua gravidez.</b></p> <p><b>Adequado:</b> explica.</p> <p><b>Inadequado:</b> não explica.</p>	0		0,5

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
<b>HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) cumprimenta o paciente simulado; (2) identifica-se; (3) dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma vez; (4) pergunta o motivo da consulta; (5) ouve o paciente com atenção. <b>Adequado:</b> realiza as cinco ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza de duas a quatro ações. <b>Inadequado:</b> realiza uma ação ou não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,25	0,5
<p><b>2. Postura:</b> (1) estabelece contato visual e (2) mantém postura empática ao longo da consulta. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações. <b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,15	0,25
<p><b>3. Escuta a fala do paciente simulado seminterrompê-lo.</b> <b>Adequado:</b> realiza integralmente a ação. <b>Inadequado:</b> não realiza a ação ou não realiza a ação integralmente.</p>	0,0		0,25
<p><b>4. Usa linguagem acessível ao paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão.</b> <b>Adequado:</b> utiliza linguagem acessível. <b>Inadequado:</b> não utiliza linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p><b>5. Responde às perguntas do paciente simulado.</b> <b>Adequado:</b> responde às perguntas. <b>Inadequado:</b> não responde às perguntas.</p>	0,0		0,25
<b>DIAGNÓSTICO CLÍNICO-LABORATORIAL</b>			
<p><b>6. Explora as características da dor:</b> (1) tempo de início e duração; (2) localização e irradiação; (3) qualidade/tipo; (4) intensidade e evolução; (5) fatores desencadeantes e atenuantes, e (6) manifestações concomitantes. <b>Adequado:</b> pergunta sobre as dez características da dor. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta quatro a seis características da dor. <b>Inadequado:</b> pergunta sobre uma a três características da dor ou não pergunta sobre característica alguma.</p>	0,0	1,0	1,5

<p><b>7. Investiga sintomas associados:</b> (1) respiratórios; (2) geniturinários; (3) gastrintestinais (4) sistêmicos (febre, mal-estar).  <b>Adequado:</b> investiga os quatro grupos de sintomas associados.  <b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois a três grupos de sintomas associados.  <b>Inadequado:</b> investiga um grupo de sintomas associados ou não investiga grupo de sintomas associados algum.</p>	0,0	0,50	1,0
<p><b>8. Pergunta sobre a existência de lesões em mucosas(boca, genitália ou ânus).</b>  <b>Adequado:</b> pergunta se há lesões em mucosas.  <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre lesões em mucosas.</p>	0,0		0,5
<p><b>9. Descreve as características da lesão:</b> (1) placa eritematosa; (2) associação com lesões vesiculares; (3) obedece ao trajeto de um dermatomo.  <b>Adequado:</b> descreve as três características da lesão.  <b>Parcialmente adequado:</b> descreve duas características da lesão.  <b>Inadequado:</b> descreve uma característica da lesão ou não descreve característica alguma.</p>	0,0	0,75	1,5
<p><b>10. Realiza diagnóstico de Herpes Zoster.</b>  <b>Adequado:</b> realiza o diagnóstico.  <b>Inadequado:</b> não realiza o diagnóstico.</p>	0,0		2,0
<p><b>11. Cita os principais diagnósticos diferenciais para o caso:</b> (1) pielonefrite; (2) nova varíola ou monkeypox; (3) varicela; (4) lombalgia mecânica/DORT; (5) urolitíase.  <b>Adequado:</b> cita os cinco principais diagnósticos diferenciais.  <b>Parcialmente adequado:</b> cita dois a quatro principais diagnósticos diferenciais.  <b>Inadequado:</b> cita um dos principais diagnósticos diferenciais ou não cita diagnóstico diferencial algum.</p>	0,0	0,50	1,0
<b>PLANO TERAPÊUTICO, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE</b>			
<p><b>12. Indica tratamento:</b> (1) medicações sintomáticas (analgésico/antitérmico e/ou anti-inflamatório); (2) antiviral oral (Aciclovir, Fanciclovir, Valaciclovir).  <b>Adequado:</b> indica ambos os tratamentos.  <b>Parcialmente adequado:</b> indica um dos tratamentos.  <b>Inadequado:</b> não indica tratamento algum.  <b>Atenção: A indicação de anti-histamínicos e/ou posologia do antiviral não afeta a pontuação nesta questão.</b></p>	0,0	0,40	1,0

## ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>ANAMNESE</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Inadequado:</b> realiza uma ação ou não realiza ação alguma.</p>	0		0,25
<p><b>2. Pergunta sobre sinais e sintomas relacionados à anemia:</b> (1)TGI (perda sanguínea como melena (ou sangue nas fezes), hematêmese); (2) ginecológica (alterações menstruais); (3) nutricional (alteração de apetite ou perguntar se estar se alimentando bem); (4) neoplásica (perda de peso não intencional recente). <b>Adequado:</b> pergunta quatro itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois ou três itens. <b>Inadequado:</b> pergunta um item ou não pergunta item algum.</p>	0	0,75	1,5
<p><b>3. Pergunta sobre manifestações neurológicas:</b> (1) alterações marcha; (2) perda de força (ou fraqueza); (3) alterações de equilíbrio (quedas ou tontura). <b>Adequado:</b> pergunta qualquer um dos itens. <b>Inadequado:</b> não pergunta. <b>Observação: não pontuará o(a) participante que mencionar o(s) sintoma(s) após a leitura do IMPRESSO 2.</b></p>	0		0,5
<p><b>4. Solicita:</b> (1) exame físico geral; (2) exame neurológico. <b>Adequado:</b> solicita ambos. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita apenas um exame. <b>Inadequado:</b> não solicita exame algum.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>5. Solicita:</b> (1) hemograma; (2) vitamina B12 (cianocobalamina); (3) qualquer exame da cinética do ferro (ferro sérico, ferritina sérica, índice de saturação de transferrina); <b>Adequado:</b> solicita todos os três exames. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita pelo menos hemograma e nível sérico de vitamina B12. <b>Inadequado:</b> solicita um ou nenhum dos exames listados. <b>Atenção: o (a) participante só irá pontuar caso ele(a) cite os exames listados ANTES de receber o impresso</b></p>	0	0,75	1,5

<p><b>6. Identificação achados laboratoriais:</b> (1) hemograma com VCM aumentado; (2) vitamina B12 baixa; (3) ferro sérico normal.</p> <p><b>Adequado:</b> identifica as três alterações.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> identifica duas alterações.</p> <p><b>Inadequado:</b> identifica uma alteração ou não identifica alteração alguma.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>7. Estabelece o diagnóstico de anemia megaloblástica secundária à deficiência de vitamina B12 (ou anemia por deficiência de vitamina B12 ou anemia perniciosa) decorrente da gastroplastia (bypass gástrico ou cirurgia bariátrica).</b></p> <p><b>Adequado:</b> estabelece o diagnóstico da anemia megaloblástica (ou anemia por deficiência de vitamina B12 ou anemia perniciosa).</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> estabelece somente o diagnóstico de anemia, sem especificá-la.</p> <p><b>Inadequado:</b> não estabelece o diagnóstico de anemia.</p>	0	1,0	2,0
<p><b>8. Indica tratamento da anemia megaloblástica parenteral ou sublingual de manutenção com vitamina B12.</b></p> <p><b>Adequado:</b> indica vitamina B12 e o tempo de tratamento.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> indica vitamina B12, mas não refere o tempo de tratamento.</p> <p><b>Inadequado:</b> não indica o tempo ou indica o tempo incorretamente.</p>	0	0,75	1,5
<p><b>9. Indica a necessidade de monitoramento dos níveis séricos de vitamina B12.</b></p> <p><b>Adequado:</b> indica monitoramento.</p> <p><b>Inadequado:</b> não indica monitoramento.</p>	0		1,0
<p><b>10. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante.</b></p> <p><b>Adequado:</b> realiza.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza.</p>	0		0,25

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Inadequado
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se e (2) cumprimenta paciente simulada.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.</p> <p><b>Inadequado:</b> realiza uma ou não realiza ação alguma.</p>	0		0,2
<p><b>2. Pergunta sobre as características da dor:</b></p> <p>(1) localização; (2) irradiação; (3) tipo; (4) fatores agravantes/melhora; (5) intensidade.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta quatro ou cinco itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois ou três itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> pergunta apenas um item ou não pergunta item algum.</p>	0	0,3	0,6
<p><b>3. Pergunta sobre sintomas associados:</b></p> <p>(1) vômito/náusea; (2) alteração de hábito intestinal; (3) acolia; (4) febre; (5) icterícia; e (6) colúria.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta cinco ou seis itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta três ou quatro itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> pergunta dois itens ou menos.</p>	0	0,4	0,8
<p><b>4. Solicita o exame físico.</b></p> <p><b>Adequado:</b> solicita.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,4
<p><b>5. Solicita os exames complementares laboratoriais:</b></p> <p>(1) hemograma; (2) PCR; (3) bilirrubinas; (4) enzimas hepáticas; (5) amilase; (6) lipase; (7) fosfatase alcalina; e (8) gamaGT.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita sete ou oito itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita de quatro a seis itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> solicita três ou menos itens.</p> <p><b>Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso cite os exames listados ANTES de receber os IMPRESSOS 2 e/ou 3.</b></p>	0	0,7	1,4
<p><b>6. Verbaliza as alterações dos exames laboratoriais:</b></p> <p>(1) HMG com leucocitose e (2) PCR aumentado.</p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza os dois itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> verbaliza um item ou não verbaliza item algum.</p>	0		0,5

<p><b>7. Solicita ultrassom de abdome.</b>  <b>Adequado:</b> solicita.  <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,6
<p><b>8. Cita a hipótese diagnóstica de colecistite aguda litiásica/calculosa.</b>  <b>Adequado:</b> cita o diagnóstico completo. <b>Parcialmente adequado:</b> cita apenas o diagnóstico de colecistite aguda.  <b>Inadequado:</b> não cita.</p>	0	0,9	1,8
<p><b>9. Cita os principais diagnósticos diferenciais:</b>  (1) pancreatite aguda; (2) cólica biliar/colecolitíase;  (3) cólica nefrética/litíase ou cálculo renal (4) <b>Colecolitíase/colangite.</b>  <b>Adequado:</b> cita três ou quatro itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> cita dois itens.  <b>Inadequado:</b> não cita item algum ou somente um .</p>	0	0,65	1,3
<p><b>10. Indica a antibioticoterapia e encaminha a paciente para a realização de colecistectomia em até 72 horas, idealmente.</b>  <b>Adequado:</b> indica o tratamento.  <b>Inadequado:</b> não indica o tratamento.  <b>Atenção: deverá ser verbalizado que o procedimento deverá ser realizado idealmente em até 72h.</b></p>	0		1,6
<p><b>11. Cita as opções cirúrgicas:</b> (1) videolaparoscopia; (2) cirurgia aberta.  <b>Adequado:</b> cita os dois itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> cita um item.  <b>Inadequado:</b> não cita item algum.</p>	0	0,15	0,3
<p><b>12. Realiza a sequência das tarefas indicadas nas orientações ao(à) participante.</b>  <b>Adequado:</b> realiza.  <b>Inadequado:</b> não realiza.</p>	0		0,5



## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se; (2) cumprimenta a mãe de maneira adequada/cordial; (3) mantém contato visual;</p> <p>(4) pergunta o nome da mãe e da criança.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza os quatro itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza dois ou três itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> realiza um item ou não realiza item algum.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>2. Realiza anamnese.</b> Pergunta sobre: (1) alteração do volume da bolsa escrotal; (2) se o aumento é intermitente (aumenta e diminui); (3) se notou aumento de volume também de região inguinal; e (4) se o bebê tem dor ou choro durante a manipulação da região inguinoescrotal; e (5) se existem fatores de melhora e piora para alteração do volume da bolsa escrotal.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta os cinco itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta três ou quatro itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> pergunta um, dois ou não pergunta item algum.</p>	0	1,0	2,0
<p><b>3. Interpreta o achado do exame físico:</b> aumento de volume cístico da bolsa escrotal, sem alterações na região inguinal.</p> <p><b>Adequado:</b> interpreta.</p> <p><b>Inadequado:</b> não interpreta.</p>	0		1,5
<p><b>4. Indica e interpreta a transiluminação da bolsa escrotal positiva com presença de líquido na bolsa escrotal.</b></p> <p><b>Adequado:</b> indica e interpreta.</p> <p><b>Inadequado:</b> não indica e/ou interpreta de forma errada.</p>	0		1,5
<p><b>5. Realiza o diagnóstico de hidrocele comunicante.</b></p> <p><b>Adequado:</b> realiza o diagnóstico de hidrocele comunicante.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza o diagnóstico de hidrocele, sem especificar o tipo (comunicante ou septada).</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza o diagnóstico de hidrocele, ou diagnostica incorretamente como hidrocele septada.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>6. Exames complementares.</b></p> <p><b>Adequado:</b> não solicita exames complementares para definir diagnóstico de hidrocele.</p> <p><b>Inadequado:</b> solicita qualquer tipo de exame laboratorial ou de imagem para definir o diagnóstico de hidrocele.</p>	0		1,0

<p><b>7. Explica para a mãe a fisiopatologia do conduto peritônio vaginal permeável.</b>  <b>Adequado:</b> explica corretamente o mecanismo de persistência e de passagem de líquido para a bolsa.  <b>Inadequado:</b> não explica corretamente a fisiopatologia da persistência ou simplesmente diz que a bolsa está cheia de líquido.</p>	0		1,0
<p><b>8. Proposta terapêutica.</b>  <b>Adequado:</b> encaminha o bebê ao cirurgião ou urologista pediátrico para definir a melhor conduta e momento cirúrgico. <b>Inadequado:</b> não encaminha o bebê ao cirurgião e/ou indica cirurgia de urgência.</p>	0		1,0
<p><b>9. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante.</b> <b>Adequado:</b> realiza.  <b>Inadequado:</b> não realiza.</p>	0		0,5

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>ATENDIMENTO INICIAL E HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) identifica-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Inadequado:</b> realiza uma ação ou não realização alguma.</p>	0		0,5
<p><b>2. Pergunta sobre as características da úlcera:</b> (1) dor; (2) quantidade de lesões; (3) tempo da lesão; (4) prurido ou ardência; (5) secreção; (6) presença de linfonodos associados. <b>Adequado:</b> pergunta sobre três ou mais itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre dois itens. <b>Inadequado:</b> não pergunta ou pergunta apenas sobre um item.</p> <p><b>Atenção: O(A) participante só pontuará se as perguntas forem feitas durante a anamnese inicial.</b> <b>O(A) participante não pontuará caso já tenha recebido os impressos relativos ao exame físico/ginecológico.</b></p>	0	0,5	1,0
<p><b>3. Questiona sobre consultas ginecológicas anteriores. (realização de “preventivo”, “papanicolau”, colpocitologia oncótica ou USTV anterior).</b></p> <p><b>Adequado:</b> questiona. <b>Inadequado:</b> não questiona.</p>	0		0,5
<b>EXAME FÍSICO</b>			
<p><b>4. Solicita exame físico/ginecológico.</b></p> <p><b>Adequado:</b> solicita. <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5
<b>EXAME LABORATORIAL/DIAGNÓSTICO</b>			

<p><b>5. Solicita exame para sífilis</b> (treponêmico ou não treponêmico).  <b>Adequado:</b> solicita.  <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		1,5
<p><b>6. Solicita outros exames para infecções sexualmente transmissíveis:</b>  (1) HIV; (2) clamídia; (3) hepatite B; (4) hepatite C; (5) herpes; (6) gonorreia; (7)HTLV.  <b>Adequado:</b> solicita pelo menos quatro itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> solicita três itens.  <b>Inadequado:</b> solicita dois ou menos itens.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>7. Cita os principais diagnósticosdiferenciais, como:</b>  (1) donovanose; (2) cancro mole; (3) herpes genital; (4) linfogranuloma venéreo; (5) doença de Behçet; (6) úlcera pós-infecciosa (Lipschutz).  <b>Adequado:</b> cita dois ou mais itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> cita um item.  <b>Inadequado:</b> não cita item algum.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>8. Estabelece o diagnóstico de sífilis recente/sífilis primária.</b>  <b>Adequado:</b> estabelece o diagnóstico de sífilis recente/sífilis primária.  <b>Parcialmente adequado:</b> estabelece apenas o diagnóstico de sífilis, sem especificar sífilis recente/sífilis primária.  <b>Inadequado:</b> não estabelece o diagnóstico ou cita fase incorreta da sífilis (tardia/latente/secundária/terciária).</p>	0	0,75	1,5
<b>PRESCRIÇÃO</b>			
<p><b>9. Prescreve penicilina benzatina:</b> 2,4 milhõesUI em dose única via intramuscular (1,2 milhões UIem cada glúteo).  <b>Adequado:</b> prescreve o medicamento com dose e via de administração corretas.  <b>Parcialmente adequado:</b> prescreve o medicamento adequado, mas sem mencionar a dose adequada ou com a dose e/ou via de administração incorretas.  <b>Inadequado:</b> não prescreve o medicamento adequado.</p>	0	0,75	1,5
<p><b>10. Informa a necessidade de tratamento das parcerias sexuais.</b>  <b>Adequado:</b> informa.  <b>Inadequado:</b> não informa.</p>	0		0,5
<b>ORIENTAÇÃO FINAL</b>			
<p><b>11. Notifica o caso de sífilis.</b><b>Adequado:</b> notifica.  <b>Inadequado:</b> não notifica.</p>	0		0,5

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO</b>			
<p><b>1. Apresentação:</b> (1) cumprimenta a paciente simulada; (2) identifica-se; (3) dirige-se à paciente simulada pelo nome, pelo menos uma vez; (4) faz perguntas; (5) e ouve com atenção o motivo da consulta.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as cinco ações.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza duas a quatro ações.</p> <p><b>Inadequado:</b> realiza uma ação ou não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,25	0,50
<p><b>2. Postura:</b> (1) estabelece contato visual e (2) mantém postura empática ao longo da consulta.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das ações.</p>	0,0	0,15	0,25
<p><b>3. Escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-la.</b></p> <p><b>Adequado:</b> realiza integralmente a ação.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza a ação.</p>	0,0		0,25
<p><b>4. Usa linguagem acessível com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão.</b></p> <p><b>Adequado:</b> usa linguagem acessível.</p> <p><b>Inadequado:</b> não usa linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p><b>5. Evita atitude paternalista (condescendente) e "alarmista."</b></p> <p><b>Adequado:</b> evita as duas atitudes.</p> <p><b>Inadequado:</b> assume qualquer uma das duas atitudes.</p>	0,0		0,25
<b>ABORDAGEM INTEGRAL AO ADOLESCENTE</b>			
<p><b>6. Investiga os antecedentes pessoais do adolescente:</b> (1) doenças prévias; (2) internações; (3) cirurgias anteriores; (4) alergias; (5) uso de medicações. <b>Adequado:</b> investiga os cinco itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois a quatro itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> investiga um item ou não investiga item algum.</p>	0,0	0,50	1,0

<p><b>7. Investiga o contexto familiar do adolescente:</b> relações entre os pais e/ou existência de violência doméstica.  <b>Adequado:</b> investiga o contexto familiar.  <b>Inadequado:</b> não investiga o contexto familiar.</p>	0,0		0,75
<p><b>8. Investiga aspectos da maturidade sexual:</b> pelos pubianos e/ou tamanho dos testículos.  <b>Adequado:</b> investiga pelo menos um dos aspectos citados.  <b>Inadequado:</b> não investiga os aspectos citados.</p>	0,0		0,75
<p><b>9. Investiga:</b> (1) tabagismo; (2) uso de álcool; (3) uso de outras drogas; (4) aspectos da saúde mental; (5) alimentação; (6) atividade física.  <b>Adequado:</b> investiga pelo menos quatro itens.  <b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois ou três itens.  <b>Inadequado:</b> investiga um ou nenhum item.</p>	0,0	0,75	1,25
<b>ABORDAGEM DA IMUNIZAÇÃO</b>			
<p><b>10. Investiga o histórico de vacinação para COVID-19.</b>  <b>Adequado:</b> investiga o histórico.  <b>Inadequado:</b> não investiga o histórico.</p>	0,0		1,0
<p><b>11. Recomenda vacinação para HPV.</b>  <b>Adequado:</b> recomenda aplicação da vacina para HPV e indica a idade correta de aplicação (dos 09 aos 14 anos).  <b>Parcialmente adequado:</b> recomenda aplicação da vacina para HPV e não indica a idade da aplicação ou informa a idade incorreta.  <b>Inadequado:</b> não recomenda aplicação da vacina para HPV.</p>	0,0	0,50	1,0
<p><b>12. Recomenda dose de reforço da vacina para HPV.</b>  <b>Adequado:</b> recomenda a dose de reforço 6 (seis) meses após a primeira dose.  <b>Parcialmente adequado:</b> recomenda a dose de reforço, mas não indica o intervalo correto entre as doses ou indica o intervalo incorreto.  <b>Inadequado:</b> não recomenda a dose de reforço da vacina para HPV.</p>	0,0	0,25	0,75
<p><b>13. Recomenda atualização do cartão de vacina:</b>  <b>(1) Meningococos ACWY:</b> dose única para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos de idade; <b>(2) dT (Difteria e Tétano):</b> dose de reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos, em caso de ferimento grave.  <b>Adequado:</b> recomenda as duas vacinas com respectivos aprazamentos.  <b>Parcialmente adequado:</b> recomenda as duas vacinas sem indicar o aprazamento OU recomenda uma vacina com aprazamento.  <b>Inadequado:</b> não recomenda nenhuma das duas vacinas ou recomenda só uma vacina sem indicar aprazamento.</p>	0	0,5	1,0

<p><b>14. Recomenda atualização do cartão de vacina:</b> <b>(1) Influenza/gripe:</b> dose anual; <b>(2) Febre Amarela:</b> dose de reforço. <b>Adequado:</b> recomenda as duas vacinas com respectivos aprazamentos. <b>Parcialmente adequado:</b> recomenda as duas vacinas sem indicar o aprazamento OU recomenda uma vacina com aprazamento. <b>Inadequado:</b> não recomenda nenhuma das duas vacinas ou recomenda só uma vacina sem indicar aprazamento.</p>	0	0,5	1,0
---	---	-----	-----