

REAPLICAÇÃO

ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Cumprimenta a paciente simulada, questiona sua idade e sua profissão.	0		0,50
2. Faz anamnese com perguntas direcionadas: questiona sobre plenitude pós-prandial, enjoo, vômitos, tipo de dor, intensidade da dor, evolução da dor, fatores de melhora e piora, irradiação. Inadequado: não faz perguntas direcionadas. Parcialmente adequado: faz até 2 perguntas direcionadas. Adequado: faz de 3 ou mais perguntas direcionadas.	0	0,50	1,00
3. Questiona sintomas associados: náuseas, febre, perda de peso, hábito intestinal.	0		1,00
4. Questiona antecedentes: tabagismo, etilismo, cirurgias prévias, medicações em uso.	0		1,00
5. Solicita exame físico.	0		1,00
6. Hipótese diagnóstica: dispepsia (DRGE); gastrite, úlcera péptica. Inadequado: não levanta hipótese diagnóstica relacionada ao caso. Parcialmente adequado: levanta a hipótese de gastrite, úlcera péptica. Adequado: levanta a hipótese de dispepsia (DRGE).	0	0,75	1,50
7. Descarta insuficiência coronariana aguda com ECG e enzimas cardíacas (impressos 2 e 3).	0		1,00
8. Solicita procedimento: endoscopia digestiva alta; ultrassonografia e exames laboratoriais. Inadequado: não solicita nenhum procedimento adequado ao caso. Parcialmente adequado: solicita apenas ultrassonografia, exames laboratoriais, ECG ou enzimas cardíacas. Adequado: solicita endoscopia digestiva alta.	0	0,50	1,00
9. Manejo da paciente: tratamento clínico com inibidor de bomba de prótons e procinéticos por 12 semanas; medidas comportamentais para DRGE. Inadequado: Não apresenta nenhum tratamento. Parcialmente adequado: Apresenta apenas medidas medicamentosas ou medidas comportamentais. Adequado: Apresenta medidas medicamentosas e comportamentais.	0	0,50	1,00
10. Orienta sobre os riscos e benefícios do uso contínuo de IBP (omeprazol).	0		1,00

REAPLICAÇÃO

ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

Inadequado: não orienta a paciente, ou orienta o uso contínuo de IBP, justificando que não causa malefício, ou orienta o não uso de IBP em nenhuma condição, pelo risco.

Adequado: orienta o uso de IBP por 12 semanas e(ou) até a reavaliação em retorno, ou orienta a paciente a usar IBP e considerar os níveis de vitamina B12 sérica e ferro a longo prazo.

REAPLICAÇÃO

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Realização do diagnóstico			
1.1. Informa que o diagnóstico provável é de cetoacidose diabética.	0		0,50
2. Interpretação dos resultados dos exames laboratoriais			
2.1. Solicita exames complementares: gasometria, glicemia sérica, eletrólitos, função renal, EAS e hemograma. Inadequado: não solicita ou solicita apenas 1 dos exames listados abaixo. Parcialmente adequado: solicita 2 dos 3 exames, gasometria, eletrólitos e EAS. Adequado: solicita todos os exames complementares indicados.	0	0,75	1,50
2.2. Informa as alterações encontradas nos resultados dos exames laboratoriais, que são compatíveis com o quadro de cetoacidose diabética: a) hiperglicemia; b) alterações hidroeletrólíticas; c) alterações ácido-básicas; e d) glicosúria/cetonúria. Inadequado: não informa as alterações ou informa apenas 1. Parcialmente adequado: informa de 2 a 3 alterações. Adequado: informa todas as alterações.	0	1,00	2,00
2.3. Informa que a classificação da gravidade da cetoacidose diabética é moderada (pH entre 7,1 e 7,2 ou bicarbonato entre 5 e 10 mmol/L).	0		1,00
3. Orientação sobre o plano de cuidados iniciais			
3.1. Indica a monitorização contínua dos sinais vitais.	0		0,50
3.2. Indica o balanço hídrico.	0		0,50
3.3. Indica a glicemia capilar de 1/1 hora.	0		1,00
3.4. Indica terapia hidroeletrólítica adequada: expansão (ressuscitação) fluídica, com a infusão de solução isotônica (NaCl 0,9% ou Ringer Lactato) 400 mL (20 mL/Kg) em 1 hora. Inadequado: não indica a expansão (ressuscitação) fluídica. Parcialmente adequado: indica a expansão (ressuscitação) fluídica, sem explicar o tipo de solução, ou o volume, ou o tempo de infusão. Adequado: indica a terapia hidroeletrólítica adequada.	0	0,50	1,00
3.5. Indica a insulino terapia adequada. Inadequado: não indica a insulina regular ou indica insulina via subcutânea. Parcialmente adequado: indica a insulina regular, mas não explica a via, ou cita via intramuscular, ou não explica que deverá ser feita por bomba de infusão contínua via endovenosa. Adequado: indica a insulino terapia adequada: insulina regular, via endovenosa e em bomba de infusão contínua.	0	1,00	2,00

ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1- Cumprimenta e identifica-se à paciente e inicia o atendimento com uma pergunta aberta. Inadequado: não executa nenhuma das ações. Parcialmente adequado: apenas cumprimenta e se identifica, ou apenas inicia o atendimento com uma pergunta aberta. Adequado: cumprimenta e se identifica à paciente; inicia o atendimento com uma pergunta aberta.	0	0,25	0,50
2- Pergunta à paciente o motivo da consulta.	0		0,25
3- Informa a necessidade do exame físico da paciente adequado ao contexto clínico.	0		0,50
4- Avalia o cartão de pré-natal da paciente.	0		0,75
5- Avalia o contexto do parto: via de parto; tempo de internação; intercorrências na maternidade; outros fatores associados. Inadequado: não avalia o contexto do parto. Parcialmente adequado: avalia apenas uma condição. Adequado: avalia duas ou mais condições.	0	0,25	0,50
6- Avaliação de problemas na mama e na amamentação.	0		0,75
7- Avaliação de problemas no lóquio vaginal e risco de sangramento vaginal: cor, volume, sangramento, evolução e sintomas sistêmicos.	0		0,25
8- Avaliação dos aspectos emocionais do puerpério: avalia os sintomas de gravidade para depressão pós-parto e transtorno psicótico puerperal, afasta esses quadros clínicos e define o diagnóstico de Baby Blues/Maternity Blues/tristeza puerperal. Inadequado: não avalia os aspectos emocionais do puerpério. Parcialmente adequado: faz perguntas genéricas quanto aos aspectos emocionais do puerpério, mas não explora o contexto familiar, não busca sinais/sintomas de gravidade para depressão pós-parto ou transtorno psicótico puerperal. Adequado: faz perguntas gerais e perguntas específicas quanto aos aspectos emocionais do puerpério, explorando o contexto familiar e(ou) buscando sinais/sintomas de gravidade para depressão pós-parto ou transtorno psicótico puerperal, além de estabelecer o diagnóstico de Baby Blues.	0	0,50	1,00
9- Busca identificar o desejo de novas gestações e avalia os critérios para indicação de métodos contraceptivos (MAC): pergunta sobre o ciclo menstrual prévio à gestação; avalia o método contraceptivo preferencial da paciente; verifica a presença de amamentação exclusiva e os riscos de determinados métodos contraceptivos; avalia risco de infecção sexualmente transmissível;	0	0,25	0,75

ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

<p>pergunta sobre o desejo de novas gestações e sobre planejamento familiar;</p> <p>avalia o risco quanto ao ganho de peso com anticoncepcional injetável trimestral;</p> <p>busca compreender o nível de conhecimento sobre os MAC.</p> <p>Inadequado: não busca identificar o desejo de novas gestações ou apenas avalia os critérios para indicação de métodos contraceptivos (MAC).</p> <p>Parcialmente adequado: busca identificar o desejo de novas gestações, mas avalia apenas uma condição.</p> <p>Adequado: busca identificar o desejo de novas gestações e avalia duas ou mais condições.</p>			
<p>10- Avalia o hábito intestinal e urinário, os níveis pressóricos, a temperatura e lacerações vaginais, na busca por eventuais complicações no parto ou mesmo doenças gestacionais tardias.</p>	0		0,25
Plano de cuidados			
<p>11- Indica uso de sulfato ferroso em dose profilática (de um a dois comprimidos de 109 mg) pelos primeiros três meses pós-parto.</p>	0		0,25
<p>12- Explica a benignidade do quadro de tristeza puerperal e a tendência de melhora logo nas primeiras duas semanas.</p>	0		0,50
<p>13- Explica que a paciente pode utilizar métodos contraceptivos (MAC) hormonais ou não hormonais, sendo os indicados para o período de amamentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAM (método da amenorreia da lactação); • preservativo masculino e feminino; • DIU; • minipílula; • injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona, 150 mg/mL). • Evitar na lactação: injetável mensal; combinado oral; e métodos comportamentais (tabelinha, muco cervical) até regularização do ciclo menstrual. • O LAM e o preservativo podem ter seu uso iniciados no pós-parto imediato, enquanto os demais são indicados somente após o puerpério (após 6 semanas do parto). <p>Inadequado: não indica corretamente nenhum MAC, ou indica equivocadamente dois ou mais MAC.</p> <p>Parcialmente adequado: indica corretamente, sem equívocos, apenas um MAC, ou indica dois ou mais MAC, porém indica equivocadamente um MAC.</p> <p>Adequado: indica corretamente, sem nenhum equívoco, ao menos dois MAC.</p>	0	0,25	1,00
<p>14- Orienta medidas para a pega correta do mamilo na amamentação, incentivando a mãe ao aleitamento materno exclusivo pelos primeiros seis meses de vida da criança.</p>	0		0,50

ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

Será considerado adequado se estiver presente na consulta ao menos uma orientação correta quanto à pega e(ou) incentivo à manutenção do aleitamento materno exclusivo.			
15- Explica as medidas para melhoria das Fissuras (hidratação do mamilo com o leite materno do fim das mamadas, banho de sol e correção da posição e da pega) e das mamas ingurgitadas (ordenha manual, massagens circulares com as polpas digitais, expressão manual do leite antes das mamadas; reforço ao bom posicionamento e boa pega). Inadequado: orienta suspensão da amamentação, ou indica apenas antibiótico, sem medidas associadas para as fissuras e ingurgitamento, ou não explica nenhuma das medidas para melhoria das fissuras ou das mamas ingurgitadas. Parcialmente adequado: explica apenas medidas para uma das condições, ou indica uso de antibiótico para o tratamento do ingurgitamento. Adequado: orienta medidas tanto para as fissuras quanto para as mamas ingurgitadas.	0	0,25	1,00
16- Propõe cuidado multiprofissional para a paciente, pelo quadro de obesidade e Baby Blues/Maternity Blues/tristeza puerperal (nutricionista, assistente social e(ou) psicólogo).	0		0,50
17- Questiona sobre dúvidas adicionais e incentiva a paciente a dirimir eventuais questões que tenham ficado pouco claras durante o atendimento.	0		0,50
18- Mantém, durante o atendimento, postura ética e acolhedora e encerra o atendimento listando os problemas elencados e as condutas propostas. Inadequado: não é ético durante o atendimento, ou é ético, porém não mantém postura acolhedora e não encerra o atendimento listando os problemas elencados e as condutas propostas. Parcialmente adequado: mantém durante o atendimento postura ética e acolhedora, mas não encerra o atendimento listando os problemas elencados e as condutas propostas, ou encerra o atendimento listando os problemas e as condutas propostas, porém não mantém postura acolhedora durante o atendimento. Adequado: mantém, durante o atendimento, postura ética e acolhedora e encerra o atendimento listando os problemas elencados e as condutas propostas.	0	0,25	0,50