

REVALIDA 2011

EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMAS MÉDICOS
EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRAS

Prova Discursiva

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das respostas das questões discursivas.
2. Confira se este caderno contém 05 questões discursivas.
3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve escrever as respostas discursivas do Caderno de Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de **tinta preta**.
4. Não se comunique com os demais estudantes nem troque de material com eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
5. Você terá três horas para responder às questões discursivas.
6. Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.
7. Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova quando restarem 30 minutos para o término do exame.

QUESTÃO 1

Um jovem, com 24 anos de idade, caixa de supermercado, previamente hígido, procurou a Unidade Básica de Saúde queixando-se de pouco apetite, febre baixa diária, emagrecimento, tosse frequente, expectoração e sudorese ao fim do dia, durante quase 3 meses. Portava uma radiografia de tórax em incidência posteroanterior feita na Unidade de Emergência há três dias, o que motivou seu encaminhamento, após avaliação, à Unidade Básica de Saúde. O exame físico realizado constatou regular estado geral, peso = 54 Kg e ausculta pulmonar com alguns roncosp e crepitações na região superior do hemitórax esquerdo.



Exame radiográfico do tórax em incidência posteroanterior.

Parte I - Com base nos dados acima apresentados, descreva:

a) os achados radiológicos relacionados ao diagnóstico.

b) a principal suspeita diagnóstica.

c) o procedimento adequado para a confirmação da suspeita diagnóstica.

d) o tratamento inicial, citando a(s) droga(s) e dose(s) preconizadas.

e) 3(três) dos principais efeitos adversos das drogas citadas.

QUESTÃO 2

Gestante, com 18 anos de idade, negra, G1P0A0, com 36 semanas e um dia de gestação, de acordo com exame ecográfico de primeiro trimestre e tempo de amenorreia, procura o Pronto-Atendimento Obstétrico queixando-se de cefaleia intensa, de início súbito há mais ou menos duas horas. Relata epigastralgia com início aproximado de meia hora e informa estar em seguimento no Ambulatório de Gestação de Alto Risco. Sua última consulta ocorreu há uma semana. Informa fazer uso de Alfa-Metil-Dopa 250mg, de 6/6h associada a Nifedipina 10 mg, ambos por via oral, de 12/12h. Os exames realizados após a última consulta mostram:

Hemograma (Hb = 12,2 g/dL; Ht = 32 %; leucócitos = 12.200 /mm³; plaquetas = 98.000 /mm³); proteinúria de 24h = 1,2 g; creatinina sérica = 1,5 mg/dL, ácido úrico sérico = 7,0 mg/dl, AST = 200 U/L, ALT = 350 U/L, Exame ultrassonográfico com biometria fetal compatível para 33 semanas, oligoâmnio acentuado, exame dopplervelocimétrico sem alterações na artéria umbilical e cerebral média do feto.

Ao exame: Pressão arterial = 160 x 120 mmHg, pulso=85 bpm; altura uterina = 30 cm; Batimentos cardíacos fetais= 170 bpm; dinâmica uterina = ausente; Toque vaginal = colo fechado, grosso, posterior; edema em MMII ++++/4+; ausculta cardíaca e ausculta pulmonar sem alterações.

Parte I - Com base no quadro clínico-obstétrico, exame físico da mãe e exames complementares apresentados, descreva

a) duas suspeitas diagnósticas:

- 1 - _____
- 2 - _____


b) três informações que justifiquem corretamente a principal suspeita diagnóstica para esse quadro clínico:

- 1 - _____
- 2 - _____
- 3 - _____

c) duas medidas imediatas a serem tomadas pelo médico em relação à paciente ainda na sala de Pronto-Atendimento Obstétrico:

- 1 - _____
- 2 - _____

Parte II - Após as medidas iniciais de assistência à paciente, realizou-se exame de Cardiotocografia, reproduzida à seguir:



d) descreva o observado no traçado cardiotocográfico representado.

Parte III - Com base nos dados apresentados, estabeleça a conduta definitiva para o caso:

e) de forma justificada, se há necessidade de internação da gestante.

f) qual é a conduta a ser tomada.

QUESTÃO 3

Mulher, com 17 anos de idade, procura atendimento médico de urgência porque está com “dor de barriga forte” e atribui o episódio ao fato de ter comido, há cerca de 12 horas, manga com leite. Comenta que a dor teve início há aproximadamente nove horas, com localização epigástrica, acompanhada de náuseas e um episódio de vômito, contendo os restos alimentares dessa refeição. Informa ainda que agora a dor está mais do lado direito, perto da “virilha”. Informa vida sexual ativa, sem uso de contraceptivos e não sabe informar quando foi a última menstruação. Nega outros sintomas e doenças prévias. Ao exame físico apresenta: Frequência cardíaca = 96 bpm, Pressão arterial = 110x70 mmHg, Frequência respiratória = 20 ipm. Está corada e hidratada. Temperatura axilar = 37,6°C. Não há alterações ao exame cardiovascular e respiratório. Exame abdominal: abdome plano com dor à percussão e à palpação do abdome inferior, principalmente na fossa ilíaca direita e região hipogástrica.

Com base nesse quadro clínico e na principal hipótese diagnóstica, descreva:

a) a complementação do exame físico do paciente que contribua para a confirmação da hipótese principal.

b) cite a principal hipótese diagnóstica e justifique.

c) cite dois diagnósticos diferenciais que devem ser considerados para o caso e justifique-os.

d) cite os exames de imagem a serem solicitados e os achados esperados para a principal hipótese diagnóstica e para os diagnósticos diferenciais.

	Exame(s) solicitado(s)	Achado(s)
Hipótese diagnóstica principal		
Diagnóstico diferencial 1		
Diagnóstico diferencial 2		

QUESTÃO 4

Uma Equipe de Saúde da Família, que atua na Unidade Básica de Saúde há dois anos, identificou a oportunidade de apresentar novas ações no campo da atenção básica, tendo como foco a atividade física e o desenvolvimento do potencial de adesão da comunidade, pois almejava a redução de taxas de sedentarismo, que atinge quase 70% da população adulta.

Considerando essas informações, faça o que se pede a seguir:

a) apresente três ações de trabalho, em saúde da família, que facilitem a adesão da comunidade a uma proposta de promoção da saúde. Justifique cada uma das ações propostas.

b) descreva quatro etapas do planejamento que a equipe precisa realizar para que a implementação da proposta de promoção da saúde, a partir do diagnóstico comunitário de alto índice de sedentarismo, tenha adesão satisfatória da comunidade.

QUESTÃO 5

Mãe leva seu terceiro filho à consulta médica, relatando que a criança, do sexo masculino, com 30 dias de vida, tem choro fraco e rouco, movimenta-se pouco e de forma lenta, e apresenta pele amarelada. Informa que a gestação evoluiu sem intercorrências, mas que só foram observados movimentos fetais a partir do sexto mês, quando a mãe passou a ter acompanhamento pré-natal regular. A criança ao nascer apresentou peso de 3000g, comprimento de 50 cm e Apgar final = 8, tendo eliminado mecônio após 48 horas de vida. Ao exame físico da criança observa-se respiração nasal ruidosa, hérnia umbilical e icterícia discreta (+/6); não apresenta más formações externas. A criança é alimentada exclusivamente com o leite materno. Não há consanguinidade entre os pais, e os dois irmãos da criança são saudáveis. O resultado do “teste do pezinho” ainda não está disponível.

Com base nos dados clínicos observados:

a) descreva a principal suspeita diagnóstica.

b) apresente cinco informações que fundamentam o diagnóstico estabelecido.

c) justifique como o “teste do pezinho” contribuirá para o prognóstico.

REVALIDA 2011

EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMAS MÉDICOS
EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRAS